

FEVE - Fabacée (légumineuse)



Origine:

Afrique du Nord et Moyen Orient.

Particularités:

Les graines d'un poids de 2 grammes sont consommées fraîches ou sèches. Elles sont riches en protéines et nourrissantes. La fève était très cultivée en France avant l'arrivée de la pomme de terre.

Environnement:

	Favorable	Défavorable	Remarques
Climat	Peu exigeante	Excès de chaleur et sécheresse	
Sol	Souple, riche en humus	Sol trop léger, séchant.	Pas d'exigence particulière
Fertilisation	Engrais potassique Compost bien mûr		Azote seulement pour le démarrage
Rotation : durée, Précédents	4 à 5 ans		
Association	Aneth, maïs, pomme de terre, laitue		

Fertilisation : (l'enrichissement éventuel d'un sol pauvre en humus, N, P, K...n'est pas pris en compte)

Exportations ou mobilisations :

N P K : 20 , 60 , 100.

(comme toutes les fabacées, la fève enrichit le sol en azote).

Apports possibles:

- reliquats de la culture précédente + complément potassique.

Calendrier et temps de travaux:

	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Plein champ		S				R		R				

Repères de temps de travaux.

Total :

Itinéraire technique conseillé:

- Labour, fertilisation, façons superficielles. La pratique du faux semis est difficile en raison de la précocité du semis.
- Binage tracté: 2 à 3 fois et léger buttage lorsque les plants mesurent 20 cm de hauteur.

Auteur: Joseph ARGOUARC'H

FORMATION CONTINUE Théodore MONOD
CFPPA RENNES-LE RHEU
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLE



<http://www.formation-continue.theodore-monod.educagri.fr>

- Binages manuels.
- Pincement éventuel de la tête au dessus de la 10^e fleur, à la faucille, afin de lutter contre le puceron et d'accélérer le grossissement des gousses.
- Récolte en vert environ 3 mois après le semis, au fur et à mesure que les gousses atteignent les 3/4 de leur longueur finale.
- Récolte à maturité lorsque les gousses ont noirci

Aspects techniques importants:

- *Maîtrise des pucerons qui envahissent presque toujours le haut des plantes. L'étêtage limite la prolifération de cet insecte.*
- *Maîtrise des adventices*

Variétés:

2 variétés :

- la fève d'Aguadulce ayant une très longue gousse contenant 8 à 9 graines ;
- la fève de Séville, variété hâtive contenant environ 6 graines de grosseur moyenne

Semis - plantation:

% plants / graines semées :	élevé.
Densité par m ² :	15 à 20 plants.
Écartements:	40 x 15 cm ou 70 x 12 cm.
Profondeur:	5 cm.
Quantité de semence ou plant / are :	3 à 4 kg (1500 à 2000 graines x 2 g)

Maladies - parasites - accidents physiologiques:

Nom	Symptôme	Prévention	Traitement
Puceron noir Autres parasites et maladies cf. le pois			

Récolte - stockage:

Stade optimal:	en vert lorsque la gousse atteint les $\frac{3}{4}$ de sa longueur définitive ; en sec, lorsque les gousses sont noires.
Dérroulement:	en vert 1 à 2 fois par semaine ; en sec on récolte les gousses en arrachant les plants.
Stockage:	dans un endroit sec.



Auteur: Joseph ARGOUARC'H



Conditionnement - vente:

Calibrage:

Emballage:

Repères de qualité:

Commentaires sur les débouchés: bonne demande surtout en hiver et au printemps

Aspects économiques:

Rendement par m2: écarts

retenu :

APPROCHE DE MARGE BRUTE par are.

Type de vente	Gros	Demi - gros	Détail
Prix de vente			
Produit			
Engrais-amendement			
Semence-plant			
Produit de traitement			
Paillage-agrotextile			
Emballage			
Autres			
Total ch. Opératio.			
MARGE BRUTE			

Marge brute / heure de travail :

Auteur: Joseph ARGOUARC'H

FORMATION CONTINUE Théodore MONOD
CFPPA RENNES-LE RHEU
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLE



<http://www.formation-continue.theodore-monod.educagri.fr>