

## Bulletin technique n° 10 du 11 avril

### Actualité



### L'édition 2017 de MedFEL met en avant la filière bio, en exclusivité.

Du 25 au 27 avril au Parc des Expo de Perpignan, retrouvez le « Marché Bio » qui regroupe l'ensemble de l'offre fruits et légumes internationale.

### Fruits à pépins

#### POMMIER-POIRIER

##### Tavelure :

Intervenir uniquement en préventif, si une pluie est annoncée, sur les variétés sensibles, avec du Soufre (5 kgs/ha). Ne plus appliquer de cuivre sur les variétés sensibles au russet.

##### Oïdium :

Dans les vergers avec une forte attaque en 2016 maintenir une protection à base de soufre en renouvelant tous les 6 à 14 jours suivant les conditions climatiques, de contaminations et la pousse.

##### Blak-rot :

Sur les vergers avec dégâts de Black-rot en 2016 protéger la chute des pétales, même en l'absence de pluies, avec le mélange soufre+ cuivre (100 g métal/ha) qui a un effet secondaire sur ce type de maladie.

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)

### Pucerons cendrés:

Sur les variétés sensibles comme Ariane, Opal, Dalinette, Topaz ou Pink prévoir un deuxième passage à la chute des pétales avec NEEMAZAL TS à 2 l/ha.

### Carpocapse :

Le vol a débuté. Si ce n'est déjà fait mettre en place la confusion sexuelle.

### Tordeuse orientale

Le pic d'éclosion est prévu autour du 21 avril. La confusion sexuelle doit être en place. Pas d'intervention à prévoir cette semaine.

### Hoplocampe du pommier

Pas de piégeage actuellement dans le réseau de parcelles de références bio en Tarn et Garonne. Pas d'intervention à prévoir pour le moment.

### Maitrise de la charge :

On observe de fortes chutes de fleurs sur vieux bois dans les vergers de Goldrush, Ariane qui ont réalisé un mélange huile plus soufre il y a deux semaines. Sur ces variétés un quatrième passage a été réalisé en général en début de semaine.

Sur toutes les variétés en fin de floraison cette semaine prévoir un dernier passage avec CURATIO à 12 l/ha lorsque 70 % du bois de l'année sera en pleine floraison.

### Feu bactérien :

Les conditions climatiques actuelles sont favorables aux contaminations. Protéger les jeunes vergers (1ère à 4ème feuille) et les parcelles contaminées avec 100 g/ha de cuivre métal ou VACCIPLANT (75 cc/hl, maxi 750 cc/ha).

## **Kiwi :**

### PSA:

On observe des symptômes très importants en verger de Hayward. Renouveler la protection avant chaque période pluvieuse.

Produits utilisables : NORDOX 75 WG (700 g/ha) ou PASTA CAFFARO (1,4 L/ha).

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)

# Fruits à noyaux

## PRUNIERS

### Pucerons :

Le PYREVERT à obtenue le 21 mars 2017 une dérogation de 120 jours sur pucerons du prunier à la dose de 1,5 l/ha, maximum 2 applications par cycle végétatif. A positionner si présence.

### Carpocapse- Tordeuse Orientale:

Le pic de pontes carpocapse et le pic d'éclosion tordeuse orientale est prévu semaine prochaine. Dans les parcelles avec des dégâts en 2016 la lutte par confusion doit être en place : ISOMAT OFM TT (300 diffus/ha) ou CIDETRAK OFM (425 diffus/ha) ou RAK 5 (500 diff/ha). Une intervention tordeuse est à prévoir semaine prochaine dans les vergers confusés avec dégâts en 2016.

## ABRICOTIERS- PECHES, NECTARINES :

### Oidium :

Période de sensibilité en cours. Le soufre, sur oïdium, est à réaliser à la dose de 5 à 7.5 kg/ha suivant les températures, à renouveler tous les 8 à 12 jours suivant les conditions climatiques.

### Tordeuse orientale

Le pic d'éclosion est prévu semaine prochaine. Dans les parcelles avec des dégâts en 2016 la lutte par confusion doit être en place : ISOMAT OFM TT (300 diffus/ha) ou CIDETRAK OFM (425 diffus/ha) ou RAK 5 (500 diff/ha). Une intervention tordeuse est à prévoir semaine prochaine dans les vergers confusés avec dégâts en 2016.

### **Rédaction :**

Jean-François Larrieu (CA82) - mars 2017

Cette action de diffusion est cofinancée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne et par l'Etat au travers du Casdar".



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)