

Bulletin technique n° 11 du 21 avril

Actualité



L'édition 2017 de MedFEL met en avant la filière bio, en exclusivité.

Du 25 au 27 avril au Parc des Expo de Perpignan, retrouvez le « Marché Bio » qui regroupe l'ensemble de l'offre fruits et légumes internationale.

Fruits à pépins

POMMIER-POIRIER

Tavelure :

Les pluies prévues pour mardi prochain vont entraîner une très forte projection.

Intervenir en préventif lundi, au plus près de la pluie, sur toutes les variétés sensibles ou résistantes, avec du Soufre (5 kgs/ha). Ne plus appliquer de cuivre sur les variétés sensibles au russet.

Oïdium :

Si les pluies de mardi amènent plus de 15 mm renouveler le soufre (5 kgs/ha) sur tous les vergers avec des symptômes. Supprimer les pousses atteintes.

Blak-rot :

Sur les vergers avec dégâts de Black-rot en 2016 le mélange soufre (5kgs/ha)+ cuivre (100 g métal/ha) a un effet secondaire sur ce type de maladie.

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)

Pucerons cendrés:

On observe quelques foyers actuellement.

Sur les variétés sensibles comme Ariane, Opal, Dalinette, Topaz ou Pink un deuxième passage à déjà dû être réalisé avec NEEMAZAL TS à 2 l/ha.

Carpocapse :

Le vol est en cours. Si ce n'est déjà fait mettre en place la confusion sexuelle.

Tordeuse orientale

Le pic d'éclosion est en cours. La confusion sexuelle doit être en place. Prévoir une intervention avec avec DELFIN, DIPEL DF (100g/hl) ou LEPINOX PLUS (100 g/ha, lessivage à 15 mm) même sur parcelles confusées.

Kiwi :

PSA:

On observe des symptômes très importants en verger de Hayward. Renouveler la protection avant chaque période pluvieuse.

Produits utilisables : NORDOX 75 WG (700 g/ha) ou PASTA CAFFARO (1,4 L/ha).

Fruits à noyaux

PRUNIER

Pucerons :

Le PYREVERT a obtenu le 21 mars 2017 une dérogation de 120 jours sur pucerons du prunier à la dose de 1,5 l/ha, maximum 2 applications par cycle végétatif. A positionner si présence.

Carpocapse- Tordeuse Orientale:

Le pic de pontes carpocapse et le pic d'éclosion tordeuse orientale est en cours. Dans les parcelles avec des dégâts en 2016 la lutte par confusion doit être en place : ISOMAT OFM TT (300 diffus/ha) ou CIDETRAK OFM (425 diffus/ha) ou RAK 5 (500 diffus/ha). Une intervention tordeuse est à réaliser cette semaine dans les vergers non-confusés ou confusés avec dégâts en 2016 avec DELFIN, DIPEL DF (100g/hl) ou LEPINOX PLUS (100 g/ha), lessivage à 15 mm.

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)

ABRICOTIERS- PECHES, NECTARINES :

Oidium :

Période de sensibilité en cours. Le soufre, sur oïdium, est à réaliser à la dose de 5 à 7.5 kg/ha suivant les températures, à renouveler tous les 8 à 12 jours suivant les conditions climatiques.

Tordeuse orientale

Le pic d'éclosion est en cours. Dans les parcelles avec des dégâts en 2016 la lutte par confusion doit être en place : ISOMAT OFM TT (300 diffus/ha) ou CIDETRAK OFM (425 diffus/ha) ou RAK 5 (500 diffus/ha). Une intervention tordeuse est à réaliser cette semaine dans les vergers non-confusés ou confusés avec dégâts en 2016 avec DELFIN, DIPEL DF (100g/hl) ou LEPINOX PLUS (100 g/ha), lessivage à 15 m.

RAISINS DE TABLE

Mildiou:

Contamination Mildiou à prévoir aux prochaines pluies.

Protéger avec *Bouillie Bordelaise RSR Disperss (1 kg/ha) ou CHAMP FLO Ampli (0,75 L/ha) ou FUNGURAN-OH (1,5 kg/ha)*.

Oïdium - Erinose:

Sur variétés sensibles à l'oïdium ou sur parcelles à problèmes Erinose traitement au soufre mouillable (3 kg/hl en jets dirigés) tous les 6 à 12 jours suivant les conditions climatiques et la pousse.

Rédaction :

Jean-François Larrieu (CA82) - mars 2017

Cette action de diffusion est cofinancée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne et par l'Etat au travers du Casdar".



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)