




**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
TARN-ET-GARONNE

Arbo Bio



Bulletin technique n° 5 du 9 mars

Actualité



REUNION TECHNIQUE : **Arboriculture Fruitière**



RÉUNION OUVERTE À TOUS

Comprendre le fonctionnement
du sol pour améliorer
l'alimentation hydrominérale

Rencontre ArboNovateur® organisée par la Chambre d'Agriculture 82 avec ses partenaires et les étudiants en Licence professionnelle CoSyA

Mardi 14 Mars 2017

Lycée Agricole de Capou * - 9h/12h30

Contact : Jean-François Larrieu – 06 72 83 07 16

Fruits à pépins

POMMIER-POIRIER

Tavelure :

Le renouvellement de la protection est nécessaire sur les variétés sensibles (Pink, Granny, Golden, Gala William's) aux stades C/D actuellement avec du cuivre faiblement dosé avant les pluies prévues fin de semaine. S'il n'y a pas de traitements aux huiles, associer 100 g/ha de cuivre métal et 5 kgs

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)

de soufre mouillable. Si le cuivre est fait avec une huile ou à un traitement aux argiles, la dose de cuivre métal doit être augmentée à 300 g/ha, en particulier sur les poiriers William's.

Pucerons cendrés:

Profiter des bonnes conditions de températures, d'aujourd'hui ou demain, pour renouveler une intervention aux huiles blanches à 10 l/ha dans les parcelles avec problèmes en 2016. Cette intervention reste indispensable sur variétés sensibles comme Ariane, Opal, Dalinette et Topaz, même si un NEEMAZAL TS est prévu avant fleur.

Pucerons lanigères :

Dans les parcelles fortement attaquées en 2016 renouveler le passage avec un traitement arbre entier huiles minérales (1l/hl)+soufre (0,5 kg/hl) ou CURATIO (24 l/ha), qui permet d'avoir un effet secondaire sur les lanigères présents. Elle est complémentaire de l'engluage de la base des troncs, à réaliser à partir de mi-mars, qui, lui, vise à limiter les remontées depuis le sol. Seules les glues d'origine naturelle sont autorisées par la grille de lecture du règlement européen bio par l'INAO.

Anthonome:

Les battages réalisés sur Montauban, la semaine dernière, ont montré que le seuil d'intervention, qui est de plus de 10 anthonomes pour 100 battages en bio, avait été atteint.

Si la dérogation, en cours de demande, est accordée, intervenir avec SUCCESS 4 (200 ml/ha) dans les parcelles à problèmes.

Poiriers :

Psylle :

Renouveler la kaolinite calcinée à 30 kg/ha avant les prochaines pluies. La kaolinite peut être associée au cuivre.

Kiwi :

Hayward stade A (gonflement) à B sur les mâles

PSA:

On observe des symptômes importants en verger de Hayward sur la zone de Montauban.

Renouveler la protection avant la prochaine période pluvieuse de fin de semaine.

Produits utilisables : NORDOX 75 WG (700 g/ha) ou PASTA CAFFARO (1,4 L/ha).

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)

Fruits à noyaux

ABRICOTIERS – PRUNIER JAPONAIS

ECA :

Repérer les arbres atteints et les éliminer si ce n'est pas encore fait. Dans les vergers qui ont préféré une protection aux argiles, plutôt qu'au BNA, renouveler la barrière physique en apportant 30 kgs/ha de kaolinite calcinée.

Monilioses :

La prophylaxie reste la base de la lutte contre les monilioses. Renouveler les traitements cuivre contre les bactérioses (100 g de cuivre métal/ha maximum) qui ont une efficacité secondaire sur monilioses en préventif. Le Soufre, utilisé contre le phytopte, a aussi une action secondaire, à la dose de 4 kg/ha si associé au cuivre. Si les prochaines pluies apportent plus de 15 mm intervenir en stop avec du CURATIO à 18l/ha, dès la fin de la pluie.

PRUNIERS DOMESTIQUES, CERISIERS :

Si non déjà réalisé profiter des bonnes conditions météo, d'aujourd'hui ou demain, pour faire un cuivre, Bouillie bordelaise (6 kgs/ha) ou Kocide (3 kgs/ha). Associer une huile blanche (10 l/ha) si problème pucerons ou cochenilles en 2016.

PECHES, NECTARINES :

Cloque-monilioses :

Renouveler la protection avec du cuivre métal à 150 g/ha, avant les pluies de fin de semaine. Le soufre a aussi une action secondaire sur monilioses, à la dose de 4 kg/ha, si associé au cuivre. Si présence de cloque intervenir en stop, en plus de traitement préventif, avec du CURATIO à 18l/ha, dès la fin de la pluie.

Rédaction :

Jean-François Larrieu (CA82) - mars 2017

Cette action de diffusion est cofinancée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne et par l'Etat au travers du Casdar".

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Agr Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»