

Bulletin technique n° 9 du 6 avril

Fruits à pépins

POMMIER-POIRIER

Tavelure :

Prévoir d'intervenir à partir de maintenant uniquement sur les variétés sensibles, avec une intervention en préventif, juste avant une pluie, avec du Soufre (5 à 7 kgs/ha) Ne plus appliquer de cuivre sur les variétés sensibles au russet.

Sur les variétés de poiriers, comme Comice, sensibles à la phytotoxicité du soufre préférer CURATIO (12 l/ha).

Oïdium :

Dans les vergers avec une forte attaque en 2016 maintenir une protection à base de soufre en renouvelant tous les 6 à 14 jours suivant les conditions climatiques, de contaminations et la pousse.

Blak-rot :

Sur les vergers avec dégâts de Black-rot en 2016 intervenir à la chute des pétales, même en l'absence de pluies, avec le mélange soufre+ cuivre (100 g métal/ha) qui a un effet secondaire sur ce type de maladie.

Pucerons cendrés:

Sur les variétés sensibles comme Ariane, Opal, Dalinette, Topaz ou Pink prévoir un deuxième passage à la chute des pétales de NEEMAZAL TS à 2 l/ha.

Pucerons lanigères :

Dans les parcelles très fortement attaquées en 2016 l'engluage de la base des troncs vise à limiter les remontées depuis le sol. Seules les glues d'origine naturelle sont autorisées par la grille de lecture du règlement européen bio par l'INAO.

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)

Capua, tordeuses de la pelure :

Période de reprise d'activité des larves. A surveiller ; si présence, intervenir à la chute des pétales avec Bacillus : DELFIN (75 g/hl), DIPEL DF (100 g/hl) ou Virus Granulose : CAPEX (10 cc/hl, maxi100cc/ha).

Tordeuse orientale

Nous sommes au tout début des pontes. Le pic d'éclosion est prévu autour du 21 avril. Si pas déjà fait, mettre en place rapidement la confusion sexuelle.

Hoplocampe du pommier

Pas de piégeage actuellement sur les pièges blancs englués placés dans le réseau de parcelles de références bio en Tarn et Garonne. Pas d'intervention à prévoir pour le moment.

Maitrise de la charge :

On observe déjà des fortes chutes de fleurs sur vieux bois dans les vergers de Goldruh, Ariane ou Juliet qui ont réalisé un mélange huile plus soufre la semaine dernière. Sur ces variétés un deuxième passage a été réalisé en général en début de semaine.

Le retour à fleur 2017 est en général bon et les conditions de pollinisation de cette semaine excellente. Sur toutes les variétés en pleine floraison sur vieux bois cette semaine (Gala, Dalinette, Story) prévoir au moins un passage avec CURATIO à 18 l/ha. Cette intervention sera à renouveler à 12 l/ha lorsque 20 à 30 % du bois de l'année sera en pleine floraison.

Feu bactérien :

Les conditions climatiques des prochains jours sont très favorables aux contaminations. Protéger les jeunes vergers (1ère à 4ème feuille) et les parcelles contaminées avec 100 g/ha de cuivre métal ou VACCIPLANT (75 cc/hl, maxi 750 cc/ha)

Kiwi :

PSA:

On observe des symptômes très importants en verger de Hayward. Renouveler la protection avant chaque période pluvieuse.

Produits utilisables : NORDOX 75 WG (700 g/ha) ou PASTA CAFFARO (1,4 L/ha).

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)

Fruits à noyaux

PRUNIERS

Pucerons :

Le PYREVERT à obtenue le 21 mars 2017 une dérogation de 120 jours sur pucerons du prunier à la dose de 1,5 l/ha, maximum 2 applications par cycle végétatif. A positionner si présence.

Carpocapse- Tordeuse Orientale:

Dans les parcelles avec des dégâts en 2016 la lutte par confusion doit être en place : ISOMAT OFM TT (300 diffus/ha) ou CIDETRAK OFM (425 diffus/ha) ou RAK 5 (500 diffus/ha).

PECHES, NECTARINES :

Oidium :

Période de sensibilité en cours. Le soufre, sur oïdium, est à réaliser à la dose de 5 à 7.5 kg/ha suivant les températures, à renouveler tous les 8 à 12 jours suivant les conditions climatiques.

Tordeuse orientale

Nous sommes au tout début des pontes. Le pic d'éclosion est prévu autour du 21 avril. Si pas déjà fait, mettre en place rapidement la confusion sexuelle : RAK 5 (500 diffus./ha), CIDETRACK OFM (425 diffus./ha) ou ISOMATE OFM TT (250 diffus./ha)

Rédaction :

Jean-François Larrieu (CA82) - mars 2017

Cette action de diffusion est cofinancée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne et par l'Etat au travers du Casdar".



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

[Ce bulletin technique fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci-dessus.](#)

Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur les sites internet suivants :

- <http://www.mp.chambagri.fr>

Les informations réglementaires sur les spécialités commerciales, les conditions d'application sont disponibles dans le Guide Arbo du Sud Ouest 2017 .

[Chambre d'Agriculture du 82 : Agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques \(agrément n° MP01929\)](#)