



Actualité

Démonstration de désherbage à la vapeur de la société Aqua Phyto le Vendredi 1 juin 2018 à 9 h 30 chez M. Sfiligoï à Aiguillon.



Fruits à pépins

▪ POMMIER POIRIER

Tavelure

Observer attentivement les parcelles afin d'adapter la protection à la situation sanitaires. *Si présence de tavelure réaliser une protection préventive avant chaque pluie avec du soufre (4kg/ha) + cuivre métal (100g/ha). Si lessivage intervenir en stop avec ARMICARB (3 kg/ha) + 3 kg de soufre.*

Oidium

En parcelles contaminées supprimer les pousses atteintes. *Maintenir une protection soufre (4 kg/ha) uniquement dans ces parcelles..*

Feu Bactérien

On observe des symptômes sur quelques parcelles. Intervenir en parcelles touchées si orages de grêles ou si les températures dépassent les 24°C.

Produit utilisable : AMYLO X (2.5 kg/ha). Le cuivre métal (100 g/ha) a aussi un effet bactéricide.

Pucerons cendrés

A partir de fin mai les repiquages présentent peu de risques sur fruits. Le parasitisme est suffisant dans la majorité des parcelles pour limiter les foyers

Intervenir au NEEMAZAL TS (azadiracthine) à 2 l/ha uniquement dans les parcelles avec absence de régulation biologique ou sur jeunes plantations. Ne pas mélanger avec le soufre.

Pucerons lanigères

Présence sur pousses de l'année.

Vérifier la présence d'Aphelinus mali qui en agriculture biologique est le seul parasite efficace pour réguler les populations de lanigères.

Capua

Le vol a démarré depuis le 10 mai.
Pas d'intervention actuellement

Tordeuse orientale

Nous sommes sur l'inter vol. Pas d'intervention à prévoir actuellement.

Carpocapse

Vol en cours. Les éclosions vont débuter. Renouveler dans les vergers non-confusés ou confusés avec dégâts en 2017 avec CARPOVIRUSINE 2000 ou EVO2 (1 kg/ha) ou MADEX TWIN ou PRO (100 cc/ha).

KIWI

PSA

Renouveler la protection en fonction des lessivages

Produits utilisables : NORDOX 75 WG (300 à 450 g/ha) ou PASTA CAFFARO (0,6 à 1,0 L/ha).

A la floraison ne plus utiliser de cuivre et intervenir avec AMYLO X (1.5 kg/ha).

Fruits à noyaux

▪ PRUNIER

Pucerons

Surveiller la présence de foyers. Dans la majorité des cas le parasitisme est suffisant pour réguler les foyers.

Carpocapse- Tordeuse orientale

Le pic des éclosions carpocapse des prunes est en cours et fin de la G1 tordeuse orientale.

Dans les parcelles avec des dégâts en 2017, même confusées, renouveler l'intervention tordeuse après les pluies avec un B.T., DELFIN, DIPEL DF (100g/hl) ou LEPINOX PLUS (1kg g/ha), ou une carpovirusine, MADEX TWIN 0.01l/hl).

Maladies du feuillage

Les conditions climatiques vont être favorables au développement de ces maladies

Les traitements soufre (4 kg/ha) + cuivre métal (100 g/ha) ont une efficacité secondaire sur ces maladies. Le CURATIO (polysulfure de calcium) a une dérogation provisoire de 120 jours pour l'usage maladies criblées à la dose de 16 l/ha, maximum 3 passages après fleur, DAR de 30 jours.

▪ ABRICOTIER - PECHE NECTARINE

Oidium

La période de sensibilité se termine au durcissement du noyau.

Renouveler le traitement soufre uniquement sur les variétés tardives, à la fin des pluies, à la dose de 5 à 7.5 kg/ha suivant les températures.

Tordeuse orientale

Fin du pic des éclosions tordeuse orientale. Pas d'intervention à prévoir actuellement.

▪ CERISIER

Drosophila suzukii

La mise en place de piégeage massif avec des attractifs n'est pas efficace seule.

Traitement à positionner dès la véraison avec SUCESS 4 (spinosad) à la dose de 0.2l/ha 2 applications maximum

Délai d'emploi avant la récolte : 3 jours

Seuls les filets insects Proof ont montré une efficacité suffisante en agriculture biologique

Raisin de table

Oïdium

A l'approche de la floraison la sensibilité est maximum.

Réaliser un soufre mouillable à 4/5 kg/ha.

Mildiou

Les conditions orageuses sont favorables à des contaminations de masse. Renouvelez au plus près des pluies afin de couvrir le maximum de jeunes feuilles.

Protéger en apportant 100g/ha de cuivre métal avec Bouillie Bordelaise RSR Disperss ou CHAMP FLO Ampli ou FUNGURAN-OH.

Black Rot

L'association Cuivre-Soufre montre une efficacité intéressante sur le black rot même si elle ne dispose pas d'une homologation.

Associez 4 / 5 kg de soufre mouillable au cuivre métal.

