



Actualité

Démonstrations outil doigts Kult Kress

Le mercredi 13 juin :

de 10 h à 12 h sur raisin de table – EARL de Paradou- Rendez-vous Parking Saveur du Quercy - 82 110 Cazes Mondenard

de 15 h à 17 h sur pommier – GAEC de la BARTHE – Rozières – 82390 Durfort-Lacapelette



Fruits à pépins

■ POMMIER POIRIER

Tavelure

Observer attentivement les parcelles afin d'adapter la protection à la situation sanitaires. *Si présence de tavelure réaliser une protection préventive avant chaque pluie avec du soufre (4kg/ha) + cuivre métal (100g /ha). Si lessivage intervenir en stop avec ARMICARB (3 kg/ha) + 3 kg de soufre.*

Oidium

En parcelles contaminées supprimer les pousses atteintes. *Maintenir une protection soufre (4 kg/ha) uniquement dans ces parcelles.*

Feu Bactérien

On observe une augmentation des symptômes sur de nombreuses parcelles. Ne pas réaliser actuellement d'interventions manuelles qui vont propager la bactérie. Intervenir en parcelles touchées si orages de grêles. *Produits utilisables : AMYLO X (2.5 kg/ha) ou cuivre métal (100 g/ha) Ne pas mélanger les deux.*

Pucerons lanigères

La présence sur pousses de l'année se développe. Pour le moment le vol d'Aphelinus mali reste très faible en verger en raison des conditions climatiques.

Capua

Pas d'intervention actuellement

Tordeuse orientale

Pas d'intervention à prévoir avant le 15 juin.

Carpocapse

Le pic d'éclosions est en cours. Si lessivage renouveler la protection dans les vergers non-confusés ou confusés avec dégâts en 2017 avec *CARPOVIRUSINE 2000 ou EVO2 (1 kg/ha) ou MADEX TWIN ou PRO (100 cc/ha).*

KIWI

PSA

Les conditions actuelles sont très favorables.

A la floraison ne pas utiliser de cuivre et intervenir avec AMYLO X (1.5 kg/ha).

Fruits à noyaux

▪ PRUNIER

Carpocapse- Tordeuse orientale

Le pic des éclosions carpodapse des prunes est en cours et vol de la G2 tordeuse orientale en cours.

Dans les parcelles avec des dégâts en 2017, même confusées, prévoir de renouveler l'intervention tordeuse, après les pluies, à partir du 15 juin avec un B.T., DELFIN, DIPEL DF (100g/hl) ou LEPINOX PLUS (1kg g/ha), ou une carpovirusine, MADEX TWIN 0.01l/hl).

Maladies du feuillage

Les conditions climatiques sont très favorables au développement de ces maladies

Les traitements soufre (4 kg/ha) + cuivre métal (100 g/ha) ont une efficacité secondaire sur ces maladies. Le CURATIO (polysulfure de calcium) a une dérogation provisoire de 120 jours pour l'usage maladies criblées à la dose de 16 l/ha, maximum 3 passages après fleur, DAR de 30 jours.

▪ ABRICOTIER - PECHE NECTARINE

Oïdium

Fin de la période de risque.

Tordeuse orientale

Début du vol de la G2 tordeuse orientale.
Pas d'intervention à prévoir actuellement avant le 15 juin/

▪ CERISIER

Drosophila suzukii

Dégâts importants dans les parcelles sans protection filets insect'proof.

Traitement à positionner dès la véraison avec SUCESS 4 (spinosad) à la dose de 0.2l/ha
2 applications maximum

Délai d'emploi avant la récolte : 3 jours

Seuls les filets insect Proof ont montré une efficacité suffisante en agriculture biologique

. TOUS FRUITS A NOYAUX

Monilioses :

Trois semaine avant récolte les traitements cuivre métal (100 à 150 g/ha) +soufre (3 à 4 kg/ha), avant une pluie, ont un effet limitant sur monilia. L'ajout de Lithotame limite la phytotoxicité sur fruits à noyaux.

Dès la fin d'un épisode pluvieux l'ARMICARB est homologué sur monilioses des fruits en pêcher à la dose de 5 kg/ha, à positionner en stop.

Raisin de table

Oïdium

La floraison est en cours, la sensibilité est maximum.

Réaliser un soufre mouillable à 4/5 kg/ha.

Mildiou

Les conditions orageuses restent favorables à de nouvelles contaminations de masse. Renouvelez au plus près des pluies afin de couvrir le maximum de jeunes feuilles.

Protéger en apportant 200g/ha de cuivre métal avec Bouillie Bordelaise RSR Disperss ou CHAMP FLO Ampli ou FUNGURAN-OH.

Black Rot

L'association Cuivre-Soufre montre une efficacité intéressante sur le black rot même si elle ne dispose pas d'une homologation.

Associez 4 / 5 kg de soufre mouillable au cuivre métal.

Botrytis :

Les mesures d'aération restent les plus efficaces pour limiter sa prolifération. En complément traitez avec AMYLO X à 2.5 kg/ha

